

Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare Actualizare 27/03/2020

În vederea optimizării activităților de **testare** pentru COVID-19, de **internare** și de **externare**, va rugăm să respectați următorul **algoritm**:

1. Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19:

Aceste recomandări au la baza documentul elaborat de Comisia Europeană, pe baza sfatului științific oferit de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC).

În acest moment România se află în stadiu pre-epidemic, înregistrându-se cazuri de import și cazuri de transmitere locală restrânsă (generația 2, 3 și 4), neexistând încă dovezi de transmitere intra-comunitară sustinută.

În aceste condiții strategia trebuie să fie axată pe **detectarea rapidă a cazurilor** de COVID-19, în vederea **limitării transmiterii**, și pe obținerea de **dovezi** de transmitere comunitară nedetectată.

Astfel, **prioritizarea** testării în ordine **descrescătoare** a importanței este următoarea:

1. Persoane **simptomice** cu istoric de călătorie internațională;
2. Contacti apropiați **simptomici** ai cazurilor confirmate;
3. Personal medico-sanitar **simptomatic**;
4. Cazuri de **pneumonie fără altă etiologie**, din **TOATE** categoriile de vârstă și din **TOATE** spitalele;
5. Cazuri de **SARI fără altă etiologie**, din **TOATE** categoriile de vârstă și din **TOATE** spitalele;
6. Persoane instituționalizate **simptomice**
7. Pacienți înainte de procedura de transplant (asimptomatici) și donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare

Testarea se face DOAR la recomandarea medicului, atât în sistemul public, cât și în cel privat de sănătate.

Categoria de pacienti	Testare imediata	Recomandare internare	Testare ulterioara si externare
1. Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internațională	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	<p>Pentru cazurile confirmate, 2 teste negative la interval de 24 de ore, din momentul în care medicul curant considera ca evoluția clinică a pacientului permite externarea</p> <p>Pentru cazurile infirmate, testare pentru <i>alti patogeni respiratori</i> și externare în momentul în care medicul curant considera ca evoluția clinică a pacientului o permite</p>
2. Contacti simptomatici ai cazurilor confirmate	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem
3. Personal medico-sanitar simptomatic	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem
4. Cazuri de pneumonie fără alta etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele	DA	Internarea este recomandată pentru toate cazurile de pneumonie.	Idem
5. Cazuri de SARI fără alta etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele	DA	Internarea peste noapte face parte din definiția de caz SARI . Ramane în izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv .	Idem
6. Persoane instituționalizate simptomatice	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem
7. Pacienti înainte de procedura de transplant (asimptomatici) și donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem

2. Categoriile de persoane care **NU** fac obiectul testării:

Categoria de persoane	Testare	Recomandare	Testare ulterioara
Contacti asimptomatici ai cazurilor confirmate, inclusiv personal medico-sanitar	NU	Auto-izolare la domiciliu 14 zile de la ultimul contact	La aparitia simptomatologiei in decurs de 14 zile de la ultimul contact
Persoane asimptomatice cu istoric de călătorie internaționala	NU	Carantina, respectiv auto-izolare la domiciliu 14 zile de la data intrării in Romania	La aparitia simptomatologiei in decurs de 14 zile de la data intrării in Romania